

Pauta para cirugía menor y dental en pacientes anticoagulados con Sintrom y con moderado/alto riesgo tromboembólico

Día	-2	-1	Cirugía	+1	+2	+3
SINTROM	NO	NO	SI	SI	SI	SI
HEPARINA	NO	SI	SI	SI	SI	NO

1- Dos días antes de la extracción o cirugía:

- a. No tomará **SINTROM**

2- Un día antes de la extracción o cirugía:

- a. **Heparina subcutánea**, una dosis a las 19:00 horas
b. No tomará **SINTROM**

3- El día de la extracción o cirugía:

- a. **Heparina subcutánea**, una inyección
b. **SINTROM**, a las 8 horas de finalizar la intervención, su dosis habitual, si no existen signos de sangrado activo

4- Un día después de la extracción o cirugía:

- a. **Heparina subcutánea**, una inyección
b. **SINTROM**, dosis habitual a la hora de siempre

5- Dos días después de la extracción o cirugía:

- a. **Heparina subcutánea**, una inyección
b. **SINTROM**, dosis habitual a la hora de siempre

6- Tres días después de la extracción o cirugía:

- a. Se suspende tratamiento de **Heparina subcutánea**
b. **SINTROM**, dosis habitual a la hora de siempre

Heparinas subcutáneas (HBPM):

Cualquiera de las siguientes a la dosis indicada, marcada con una **X**

- Fraxiparina 0,6 mL**, una iny. subcutánea cada horas
- Clexane 40 mg/0,4 mL**, una iny. subcutánea cada horas
- Fragmín 5000 UI/0,2 mL**, una iny. subcutánea cada horas

- Si persiste el sangrado postextracción o postcirugía, efectuará enjuagues con **AMCHAFIBRIM** ampollas, cada 2-4 horas mientras persiste el sangrado (sin comer ni beber hasta 1 hora después).
- Profilaxis de endocarditis, SI PROCEDE:
 - AMOXICILINA 2 gr.** vía oral 1 hora antes de la cirugía
 - Si es alérgico: **CLINDAMICINA 600 mg** vía oral 1 hora antes de la cirugía